Les types de la collection M. Pic
I. Chrysomelinae *et* Hispinae *du Nouveau-Monde*

Par A. Descarpentries et A. Villiers.

La collection M. Pic, que cet entomologiste a généreusement léguée au Muséum de Paris en 1958, est d'une extrême importance en raison du grand nombre de types qu'elle renferme. Ceux-ci, décrits de façon quelquefois un peu sommaire, font l'objet de nombreuses demandes d'examen de la part de spécialistes français et étrangers et il importe que le personnel du Laboratoire d'Entomologie soit à même de leur donner satisfaction.

Malheureusement, vers la fin de sa vie, M. Pic n'a pas pu entretenir sa collection de façon suffisante et de nombreux cartons ont été attaqués par les Insectes destructeurs ou les moisissures, et un certain nombre de types ont été détruits. D'autre part, certaines collections anciennes n'ont pas été classées de sorte que les types sont dispersés. Enfin, certains types sont difficilement reconnaissables du fait d'un étiquetage incomplet.

Dans ces conditions, une remise en état et en ordre s'est avérée indispensable et elle a été aussitôt entreprise. Il s'agit là, on le devine, d'un travail de longue haleine qui demandera certainement plusieurs années pour être mené a bien.

Les *Chrysomelidae Hispinae* du Nouveau-Monde ayant été, les premiers, remis en ordre, il nous a semblé utile de publier une liste des types retrouvés et consultables. Nous avons profité de cette occasion pour préciser, chaque fois que c'était possible, la localité exacte des types, cette mention n'étant le plus souvent donnée que d'une façon très générale dans les descriptions originales.

La collection d'Hispines de M. Pic a été constituée par la collection Donkier, en majeure partie étudiée par Weise, et à laquelle M. Pic a ajouté divers matériaux acquis par achat (chez Staudinger, Clermont, Le Moult, Baer, etc...), par échange (Uhmann) et par adjonction de fragments de collection (Perroud, etc.).

Dans la liste qui suit nous avons suivi l'ordre et la nomenclature du *Coleopterorum Catalogus* (Uhmann, 1957).

Abréviations : Ht., holotype ; pt., paratype.

Genre **Œdiopalpa** Baly.

(= *Amplipalpa* Harold).

atripes Pic 1926. — Brésil : Rio Verde (Goyaz). — Ht.
donckieri Pic 1923. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht.
foveipennis Pic 1923. — Bolivie : Cochabamba. — Ht.
nigritula Weise (*pertyi* var.) 1905. — Brésil : Ceara. — Ht.
subconstricta Pic 1923. — Brésil : Therezopolis. — Ht.
testaceipes Pic 1926. — République Argentine : Missiones. — Ht.
viridipennis Pic 1937. — Pérou. — Ht.

Genre **Homalispa** Baly.

diversipes Pic 1936. — Brésil : Hansa. — Ht.
signata Pic 1926. — République Argentine : Rio Parana. — Ht.
subelongata Pic 1936. — Bolivie : Cochabamba. — Ht.
donckieri Pic (*vespertina* var.) 1936. — Guyane : Cayenne. — Ht.

Genre **Demotispa** Baly.

atra Pic 1926. — Venezuela. — Ht.
baeri Pic 1926. — Pérou : Tocache (Huallaga). — Ht.
bicoloricornis Pic 1926. — Guyane française : Saint-Jean du Maroni. — Ht.
biplagiata Pic 1923. — Colombie : Santa Fé de Bogota. — Ht.
carinata Pic 1934. — Vénézuela : Colonie Tovar. — 1 pt.
cayennensis Pic 1923. — Guyane française : Cayenne. — Ht.
clermonti Pic 1934. — Brésil : Hansa (Santa Catharina). — Ht.
fallaciosa Pic 1923. — Pérou : Marcapata. — Ht.
flavipennis Pic 1923. — Bolivie : Cochabamba. — Ht.
fulvimana Pic 1923. — Brésil : Mineiro (Goyaz). — Ht.
germaini Weise 1950. — Bolivie : Cochabamba. — Ht.
jataiensis Pic 1923. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht.
madoni Pic 1936. — Guyane française : Cayenne. — Ht.
nigronotata Pic 1936. — Brésil : Hansa (Santa Catherina). — Ht.
rufa Pic 1926. — Guyane française : roches de Kourou. — Ht., 1 pt.
scutellaris Pic 1926. — Brésil : Rio Verde (Goyaz). — Ht.
submarginata Pic 1934. — Vénézuela. — Ht.
testaceicornis Pic 1926. — Pérou : Marcapata. — Ht.
tricolor Weise 1905. — Bolivie : Cochahamba. — Ht.

Genre **Euxema** Baly.

elongata Pic 1934. — Vénézuela : Colonie Tovar. — 1 pt.

Genre **Cephaloleia** Chevrolat.

(= *Cephalolia* Blanchard).

abdominalis Pic 1926. — Pérou : Tocache (Huallaga). — Ht.
applicata Pic 1923. — Équateur : Cachabé. — Ht., 2 pt.
atriceps Pic 1926. — Costa-Rica : Turrialba. — Ht., 1 pt.
basalis Pic 1926. — Brésil : Spirito-Santo. — Ht.
bicoloripes Pic 1926. — Brésil. — Ht.
bifasciata Weise 1905. — Équateur. — Ht., 7 pt.
biolleyi Pic (*stenosoma* var.) 1926. — Costa-Rica. — Ht., 3 pt.
bipartita Pic 1926. — Pérou : Marcapata. — Ht.
castanea Pic, 1929. — Brésil. — Ht.
convexifrons Pic 1923. — Bolivie : Cochabamba. — Ht.
dilectans Pic 1923. — Équateur. — Ht., 3 pt.
donckieri Pic 1926. — Guyane Française : Cayenne. — Ht., 2 pt.
forestieri Pic 1926. — Guyane Française. — Ht.
h-nigrum Pic 1923. — Équateur : Cachabé. — Ht. 2 pt.
insidiosa Pic 1923. — Équateur. — Ht., 2 pt.
latipennis Pic 1928. — Bolivie : Cochabamba. — Ht.
limbata Pic 1928. — République Argentine : Parana. — 1 pt. [1].
lojaensis Pic 1931. — Équateur : Loja. — Ht.
macella Pic 1923. — Bolivie : Cochabamba. — Ht., 1 pt.
minasensis Pic 1931. — Brésil : Minas. — Ht.
nevermanni Uhmann 1930. — Costa-Rica. — 1 pt.
nigripes Pic (*distincta* var.) 1926. — Costa-Rica : Turrialba. — Ht.
nigrithorax Pic 1930. — Vénézuela : El Naranjo. — Ht.
nubila Weise 1905. — Équateur : Chimbo. — Ht., 4 pt.
palmarum Pic 1923. — Équateur. — Ht., 3 pt.
recondita Pic 1923. — Équateur. — Ht., 3 pt.
reducta Pic (*parenthesis* var.) 1926. — Amérique méridionale. — Ht.
rosenbergi Weise 1905. — Équateur : Chimbo. — Ht., 5 pt.
schmidti Uhmann 1933. — Costa-Rica : San-José. — 1 pt.
stenosoma Baly 1885. — Panama : Bugaba. — 1 pt.
sulciceps Baly 1885. — Panama : Bugaba. — 1 pt.
unctula Pic 1923. — Équateur. — Ht., 1 pt.
uniguttata Pic 1923. — Pérou. — Ht.
vagelineata Pic 1926. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht.
viridis Pic 1931. — Brésil : Minas. — Ht.

1. *L'Echange*, XLIV, n° 431, p. 4 : espèce omise au *Coleopterorum Catalogus*.

Genre **Solenispa** Weise.

bicolor Pic 1931. — Équateur : Loja. — Ht.
claripes Pic 1923. — Brésil : Thcrezopolis. — Ht.
germaini Pic 1926. — Bolivie : Cochabamba. — Ht., 5 pt.
impressicollis Weise 1905. — Bolivie : Cochabamba. — Ht.

Genre **Stenispa** Baly.

elongata Pic 1922. — Brésil : Bahia. — Ht.
parallela Pic 1930. — République Argentine : Rosas. — Ht.
robusticollis Pic 1922. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht.

Genre **Xenarescus** Weise.

atricolor Pic (*monoceros* var.) 1927. — Vénézuéla : Caracas. — Ht., 2 pt.
atriceps Pic (*monoceros* var.) 1927. — Vénézuéla : Caracas. — Ht.
bijunctus Pic (*monoceros* var.) 1927. — Vénézuéla : Caracas. — Ht., 5 pt.
bisbinotatus Pic (*monoceros* var.) 1927. — Vénézuéla : Caracas. — Ht.
caudatus Sallé (= *monoceros* ♂) 1849. — Vénézuéla : Caracas. — Ht.
donckieri Pic (*monoceros* var.) 1927. — Vénézuéla : Caracas. — Ht., 2 pt.
interruptus Pic (*monoceros* var.) 1927. — Vénézuéla : Caracas. — Ht., 1 pt.
junctus Pic (*monoceros* var.) 1927. — Vénézuéla : San Estevan. — Ht.
maculaticollis[1] Pic (*monoceros* var.) 1927. — Vénézuéla : Caracas. — Ht. 2 pt.
nigrocaudatus Pic (*monoceros* var.) 1927. — Vénézuéla : Caracas. — Ht., 2 pt.
notaticollis Pic (*monoceros* var.) 1927. — Vénézuéla : Caracas. — Ht. 3 pt.
quadripunctus Pic (*monoceros* var.), 1927. — Brésil. — Ht. [2].
quadrimaculatus Sallé (= *monoceros* ♀) 1849. — Vénézuéla : Caracas. — Ht. [3].
quadrinotatus Pic (*monoceros* var.) 1927. — Vénézuéla. — Ht.
rufocaudatus Pic (*monoceros* var.) 1927. — Vénézuéla : Caracas. — Ht.

1. et non *maculicollis* comme il est indiqué au *Coleopterorum Catalogus*, 1957, p. 31.
2. et non Vénézuéla comme il est indiqué au *Coleopterorum Catalogus* 1957, p. 31.
3. Il n'existe pas de *quadrimaculatus* Pic comme l'indique le *Coleopterorum Catalogus* 1957 ; Ce nom est en effet bien cité par Pic dans son travail de 1927 (*Bull. Soc. Zool. Fr.*, LII, p. 524) mais il s'agit de la forme ♀ *quadrimaculatus* Sallé.

sallei Pic (*monoceros* var.) 1927. — Vénézuéla : Caracas. — Ht.
simoni Pic (*monoceros* var.) 1927. — Vénézuéla : San Estevan. — Ht., 1 pt.
subdilatatus Pic (*monoceros* var.) 1927. — Vénézuéla. — Ht.
subjunctus Pic (*monoceros* var.) 1927. — Vénézuéla. — Ht.
submarginatus Pic (*monoceros* var.) 1927. — Vénézuéla : Caracas. — Ht.
subobliteratus Pic (*monoceros* var.) 1927. — Vénézuéla : Caracas. — Ht.
suturalis Pic (*monoceros* var.) 1927. — Vénézuéla : Caracas. — Ht.
testaceiceps Pic (*monoceros* var.) 1927. — Vénézuéla : Caracas. — Ht.
testaceicollis Pic (*monoceros* var.) 1927. — Vénézuéla : Caracas. — Ht., 2 pt.
trijunctus Pic (*monoceros* var.) 1927. — Vénézuéla : Caracas. — Ht., 2 pt.
trinotatus Pic (*monoceros* var.) 1927. — Vénézuéla : Caracas. — Ht., 3 pt.
uninotatus Pic (*monoceros* var.) 1927. — Vénézuéla. — Ht.

Genre **Arescus** Perty.

apicalis Pic (*histrio* var.). — Équateur. — Ht.
atricollis Pic (*histrio* var.) 1927. — Équateur. — Ht.
boliviensis Pic (*labiatus* var.) 1927. — Bolivie : Cochabamba. — Ht.
donckieri Pic (*histrio* var.) 1927. — Équateur. — Ht., 1 pt.
flavescens Pic (*histrio* var.) 1927. — Équateur. — Ht.
germaini Pic (*labiatus* var.) 1927. — Bolivie : Cochabamba. — Ht.
humeralis Pic (*histrio* var.) 1927. — Équateur. — Ht. [1].
inhumeralis Pic (*histrio* var.) 1927. — Équateur. — Ht., 2 pt.
inlimbatus Pic (*histrio* var.) 1927. — Équateur. — Ht.
multinotatus Pic (*labiatus* var.) 1927. — Équateur. — Ht.
notaticollis Pic (*histrio* var.) 1927. — Équateur. — Ht.
notatus Pic (*histrio* var.) 1927. — Équateur. — Ht.
pseudohumeralis nom. nov (= *humeralis* Pic 1927). — Équateur. — Ht.
reducta Pic (*histrio* var.) 1927. — Équateur. — Ht.
rubricolor Pic (*histrio* var.) 1927. — Équateur. — Ht.
sublimbatus Pic (*histrio* var.) 1927. — Équateur. — Ht.
subruber Pic (*labiatus* var.) 1927. — Équateur. — Ht., 2 pt.
testaceicollis Pic (*histrio* var.) 1927. — Équateur. — Ht.

1. Dans son travail de 1927 (*Ent. Nachr. Bl.*, 1, 4, p. 71), Pic a décrit 2 variétés différentes de *A. histrio* sous le nom de *humeralis*. La seconde désignée (24e ligne) prendra le nom nouveau de *pseudohumeralis*.

Pseudocolaspidea Jacobson.

atrocincta Pic 1934. — Amérique méridionale. — Ht., 1 pt.
disjuncta Pic 1934. — Amérique méridionale. — Ht.
divisa Pic 1922. — Haut-Amazone. — Ht.

Genre **Alurnus** Fabricius.

bipartitus Pic (*costalis* var.) 1926. — Équateur. — Ht.
dallieri Pic (*costalis* var.) 1926. — Équateur. — Ht.
divisus Pic 1922. — Haut Amazone. — Ht.
lansbergei Sallé 1849. — Vénézuéla : Caracas. — Ht., 3 pt.
panamensis Pic (*salvini* var.) 1922. — Panama. — Ht.

Genre **Mecistomela** Jacobson.

(= *Psilurnus* Weise).

brevenotata Pic (*marginata* var.) 1922. — Brésil : Rio Campisto. — Ht.
reducta Pic (*marginata* var.) 1922. — Brésil. — Ht.

Genre **Coraliomela** Jacobson.

bicoloripes Pic (*aeneoplagiata* var.) 1922. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht.
bijuncta Pic (*corallina* var.) 1922. — Brésil. — Ht.
donckieri Weise (*aeneoplagiata* var.) 1905. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht.

Genre **Prosopodonta** Baly.

bicoloripes Pic 1934. — Costa-Rica : Turrialba. — Ht.

Genre **Sceloenopla** Chevrolat.

(= *Cephalodonta* Chevrolat).

(= *Microdonta* Chevrolat).

Sous-genre **Sceloenopla** s. str.

albofasciata Pic 1938. — Guyane Française : St Laurent-du-Maroni. — Ht.
annulipes Pic 1932. — Pérou : Marcapata. — Ht., 1 pt.
atricornis Pic 1929. — Brésil. — Ht.

atrospina Pic 1929. — Guyane Française : Maroni [1]. — Ht.
basalis Pic 1929. — Pérou : Huallaga. — Ht., 1 pt.
bicoloricornis Pic 1929. — Bolivie : Cochabamba. — Ht., 2 pt.
bilineata Pic 1929. — Bolivie : Cochabamba. — Ht.
bimaculaticollis Pic 1948. — Brésil : Sao Paulo. — Ht.
biolleyi Pic 1929. — Costa-Rica. — Ht., 2 pt.
boliviensis Pic 1929. — Bolivie : Cochabamba. — Ht., 1 pt.
brevispina Pic 1929. — Équateur : Loja. — Ht.
callangana Pic 1929. — Pérou : Callanga. — Ht., 3 pt.
carinaticornis Pic 1929. — Guyane Française : Cayenne. — Ht., 1 pt.
cassidiformis Pic 1929. — Costa-Rica. — Ht.
cayennensis Pic 1929. — Guyane Française : Cayenne. — Ht.
cincta Weise 1905. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht.
crassicornis Pic 1929. — Pérou : Chinchamayo. — Ht.
diversa Pic (*uhmanni* var.) 1929. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht.
donckieri Weise 1904. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 16 pt.
germaini Pic 1929. — Bolivie : Cochabamba. — Ht., 2 pt.
guyanensis Pic 1929. — Guyane Française : Cayenne. — Ht.
humeralis Pic 1929. — Bolivie : Cochabamba. — Ht.
jatahyensis Pic 1929. — Bésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 3 pt.
lojaensis Pic 1932. — Équateur : Loja. — Ht.
major Pic 1929. — Bolivie : Cochabamba. — Ht., 1 pt.
marcapatana Pic 1932. — Pérou : Marcapata. — Ht., 1 pt.
obliterata Pic (*soluta* var.) 1929. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 1 pt.
perroudi Pic (*apicicornis* var.) 1934. — Colombie. — Ht.
peruviana Pic 1929. — Pérou : Chinchamayo. — Ht.
rectelineata Pic 1929. — Pérou : Marcapata. — Ht.
reducta Pic (*germaini* var.) 1929. — Bolivie : Cochabamba. — Ht.
rubrosinuata Pic 1921. — Pérou : Marcapata. — Ht., 1 pt.
sinuaticollis Pic 1932. — Pérou : Marcapata. — Ht.
soluta Weise 1905. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 21 pt.
subfasciata Pic 1928. — Brésil. — Ht.
submarginata Pic (*uhmanni* var.) 1929. — Brésil : Jatahy. — Ht.
subsuturalis Pic (*uhmanni* var.) 1929. — Brésil : Jatahy. — Ht.
testaceipennis Pic 1929. — Costa-Rica : Turrialba. — Ht., 5 pt.
testaceonotata Pic (*westwoodi* s. sp.) 1934 : Vénézuéla : San Esteban. — Ht.
uhmanni Pic 1929. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 8 pt.
violaceipennis Pic 1929. — Vénézuéla : Caracas. — Ht., 3 pt.
viridifasciata Pic 1929. — Bolivie : Cochabamba. — Ht., 1 pt.
viridinotata Pic 1929. — Bolivie : Cochabamba. — Ht.

1. et non Cayenne comme Pic l'a indiqué par erreur dans sa description.

Sous-genre **Ocnosispa** Weise.

atripennis Pic 1929. — Pérou : Huallaga. — Ht.
bilineaticollis Pic 1937. — Brésil. — Ht.

Sous-genre **Pseudispa** Chapuis.

baeri Pic 1928. — Pérou : Huallaga. — Ht.
basicornis Pic 1928. — Pérou : Marcapata. — Ht., 1 pt.
breveapicalis Pic 1934. — Mexique. — Ht.
clara Weise 1904. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 9 pt.
viridis Pic 1934. — Brésil. — Ht.

Genre **Acentroptera** Baly.

maculata Pic 1932. — Brésil : Therezopolis. — Ht.
reducta Pic (*basilica* var.) 1932. — Amérique méridionale. — Ht.
rubronotata Pic 1933. — Brésil : Tapera. — Ht., 2 pt.

Genre **Hispoleptis** Baly.

subfasciata Pic 1938. — Brésil : Obidos. — Ht.

Genre **Odontispa** Uhmann.

latipennis Pic 1928. — Brésil : Neu Friburg. — Ht.

Genre **Metaxycera** Baly.

basithorax Pic 1931. — Guyane Française : Cayenne. — Ht., 19 pt.
donckieri Pic 1932. — Guyane Française : Cayenne. — Ht.
particularis Pic 1932. — Haut Pérou. — Ht.
sinuatevittata Pic 1932. — Guyane : Maroni. — Ht.
subapicalis Pic 1931. — Paraguay. — Ht., 1 pt.

Genre **Decatelia** Weise.

costata Pic 1927. — Bolivie : Cochabamba. — Ht., 2 pt.
lema Weise 1904. — Bolivie : Cochabamba. — Ht., 4 pt.
testaceicollis Pic 1934. — Brésil : Hansa (Sta Catharina). — Ht.
testaceipes Pic 1934. — Brésil : Hansa (Sta Catharina). — Ht.

Genre **Paradecatelia** Uhmann 1940.

atritarsis Pic 1927. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht.

Genre **Stethispa** Baly.

chilensis Pic 1933. — Chili. — Ht.
elongata Pic 1929. — Guyane Française : Cayenne. — Ht.
germaini Pic 1929. — Bolivie : Cochabamba. — Ht.
impressicollis Pic 1934. — Guyane : Maroni. — Ht.
lineaticollis Pic 1927. — Colombie : Santa Fé de Bogota. — Ht., 1 pt.
longispina Pic 1927. — Guyane : Maroni [1]. — Ht.
pallidior Pic 1927. — Bolivie : Cochabamba. — Ht.
rufospina Pic. — Brésil. — Ht., 1 pt.
unimaculata Pic 1929. — Costa-Rica : Turrialba. — Ht., 1 pt.

Genre **Charistena** Baly.

brasiliensis Pic 1927. — Brésil. — Ht.
brevelineata Pic 1927. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 2 pt.
brevenotata Pic 1927. — Brésil : Rio de Janeiro. — Ht.
deyrollei Baly 1864. — Colombie : Bogota. — Ht.
laticollis Pic 1927. — République-Argentine. — Ht.
minima Pic 1934. — Mexique. — Ht.

Genre **Sternostena** Weise.

lateralis Pic 1932. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht.
laterubra Pic (*basalis* var.) 1932. — Brésil : Rio Verde (Goyaz). — Ht.

Genre **Sternoplispa** Uhmann.

nigrohumeralis Pic 1927. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 1 pt.

Genre **Anisostena** Weise.

angustata Pic 1934. — Brésil : Hansa (Santa Catharina). — Ht.
breveapicalis Pic 1934. — Brésil : Hansa (Santa Catharina). — Ht.
diversicostata Pic (*pilatei* var.) 1932 ; — Costa-Rica : Turrialba. — Ht., 2 pt.
testacea Pic 1934. — République Argentine : Corrientes. — Ht.

Genre **Anoplitis** Kirby.

annulipes Pic 1932. — Brésil : Therezopolis. — Ht.
bifasciata Pic 1929. — Brésil : Jatahy. — Ht.

1. et non Cayenne comme Pic l'a indiqué par erreur dans sa description.

binotaticollis Pic 1929. — Guyane Française : roches de Kourou. — Ht.
brevenotata Pic 1929. — Brésil : Sao Paulo. — Ht.
curta Pic 1929. — Bolivie : Cochabamba. — Ht.
germaini Pic 1929. — Bolivie : Cochabamba. — Ht., 1 pt.
imparallela Pic 1932. — Costa-Rica : Turrialba. — Ht., 1 pt.
lateapicalis Pic 1934. — Brésil : Hansa (Santa Catharina). — Ht.
latior Pic 1932. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 4 pt.
marginella Weise 1905. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 7 pt.
minima Pic 1932. — Bolivie : Cochabamba. — Ht.
minuta Pic 1932. — Bolivie : Cochabamba. — Ht.
obidosensis Pic 1929. — Brésil : Obidos. — Ht., 1 pt.
peruana Pic 1929. — Pérou : Marcapata. — Ht.
regularis Weise 1905. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 10 pt.
signifera Weise 1905. — Bolivie : Cochabamba. — Ht., 5 pt.
subapicalis Pic (*terminata* var.) 1929. — Mexique : Cordova. — Ht.

Genre **Clinocarispa** Uhmann.

fasciatipennis Pic 1932. — Pérou : Marcapata. — Ht.
notaticeps Pic (*sauveuri* var.) 1931. — Pérou : Marcapata. — Ht.
prolongata Pic (*sauveuri* var.) 1931. — Pérou : Marcapata. — Ht.

Genre **Chalepotatus** Weise.

inapicalis Pic 1934. — Brésil : Hansa (Santa Catharina). — Ht.
latenotatus Pic 1934. — République Argentine : San Ignacio (Misiones). — Ht.

Sous-genre : **Macrochalepus** Pic.

longior Pic 1929 (*antennalis* var.). — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht.

Genre **Chalepus** Thunberg.

aeneiceps Pic 1927. — Brésil : Uberaba. — Ht.
alternevittatus Pic 1932. — Pérou : Chanchamayo. — Ht.
aurantiacicollis Pic 1931. — Brésil : Rio Grande do Sul [1]. — Ht.
australis Uhmann 1935 (*sanguinicollis* var.). — Brésil : Nova Teutonia (Santa Catharina). — 1 pt.
bahianus Pic (*flexuosus* var.) 1931. — Brésil : Bahia. — Ht.
bellulus Chapuis 1977. — Mexique. — 1 pt.
bicoloriceps Pic 1931. — Pérou : Marcapata. — Ht.

1. Le type unique, désigné de la main même de Pic, provient du Brésil et non du Pérou comme il est indiqué dans la description, sans doute par erreur.

binotaticollis Pic 1931. — Pérou : Marcapata. — Ht.
bivitattus Pic 1932. — Bolivie : Cochabamba. — Ht., 1 pt.
breveapicalis Pic 1931. — Vénézuéla : Caracas. — Ht.
caracasensis Pic 1931. — Vénézuéla : Caracas. — Ht., 1 pt.
germaini Pic 1931. — Bolivie : Cochabamba. — Ht., 1 pt.
guatemalanus Pic 1934. — Guatemala : El Naranjo. — Ht.
inlateralis Pic 1932 (*alternevittatus* var.). — Brésil : Therezopolis. — Ht.
longehumeralis Pic 1931. — Vénézuéla : Caracas. — Ht.
mineiroensis Pic 1932. — Brésil : Mineiro (Goyaz). — Ht. 1 pt.
nigrithorax Pic 1931. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht.
obidosensis Pic 1931. — Brésil : Obidos. — Ht.
parananus Pic 1927. — République Argentine : Rio Parana. — Ht.
pauli Pic 1932. — Brésil : Sao Paulo. — Ht.
reductus Pic 1931 (*obidosensis* var.). — Brésil : Obidos. — Ht.
reductus Pic 1932 [1]. — Costa-Rica : Turrialba. — Ht., 3 pt.
robusticornis Pic 1931 (= *flexuosus* Guér.). — Brésil : Rio Grande do Sul. — Ht. 2 pt.
ruficollis Pic 1932. — Bolivie. — Ht.
schmidti Uhmann 1955. — Costa Rica : San José. — 1 pt.
scutellaris Pic 1931. — Jamaïque. — Ht.
sedulus Weise 1905 (= *putzeysi* Chap.). — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 3 pt.
stigmula Chapuis 1877 (= *sanguinicollis* L.). — Brésil : Bahia. — 1 pt.
semiobliteratus Pic 1932 (*viduus* var.). — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht.
stigmula Chapuis 1877 (= *sanguinicollis* L.). — Brésil : Bahia. — 1 pt.
strandi Uhmann 1936 (*marginiventris* var.). — Brésil : Nova Teutonia. — 1 pt.
subcordiger Uhmann 1935. — Paraguay : Santa Trinidad. — 1 pt.
subfasciatus Pic 1931 (= *viduus* Weise). — Bolivie : Cochabamba. — Ht., 4 pt.
sublateralis Pic 1932 (*flexuosus* var.). — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 1 pt.
submarginatus Pic 1932. — Brésil : Therezopolis. — Ht.
submetalicus Pic 1931. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 1 pt.
testaceiceps Pic 1931. — Guyane Française : Maroni. — Ht.
trivittatus Pic 1932. — Amérique méridionale. — Ht.

1. Nom préoccupé par Pic lui-même (voir ci-dessus). Nous proposons le nouveau nom de *Pici*.

Genre **Xenochalepus** Weise.

Sous-genre **Hemichalepus** Spaeth.

erichsoni Weise 1905. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 21 pt.
nigripes Weise 1905. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 13 pt.
subomeger Uhmann 1937. — Costa-Rica : San José. — 1 pt.
subpalliatus Uhmann 1937 (*subomeger* var.). — Costa-Rica : San José. — 1 pt.

Sous-genre **Xenochalepus** Weise.

annulatus Pic 1931. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht.
bajulus Weise 1911. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 1 pt.
boliviensis Pic 1931. — Bolivie : Cochabamba. — Ht., 1 pt.
brasiliensis Pic 1931. — Brésil. — Ht.
chromaticus Baly 1885. — Panama : Chiriqui. — 1 pt.
congruus Pic 1931 (*guerini* var.). — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 1 pt.
curticornis Pic 1931. — Guyane : Cayenne. — Ht.
dilaticornis Pic 1931 [1]. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 19 pt.
discointerruptus Pic 1932. — Amérique méridionale. — Ht.
diversipes Pic 1931. — Bolivie : Cochabamba. — Ht.
donckieri Pic 1931. — Colombie : Santa Fé de Bogota. — Ht., 2 pt.
faustus Weise 1905. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 24 pt.
goyasensis Pic 1931. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 2 pt.
jatahyensis Pic 1934 (*guerini* var.). — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht.
latecinctus Pic 1932 (*signaticollis* var.). — Mexique : Guanajato. — Ht.
lateobliteratus Pic 1931 (*guerini* var.). — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht.
latereductus Pic 1931 (*bajulus* var.). — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht. 2 pt.
longiceps Pic 1931. — Pérou : Marcapata. — Ht.
maculiventris Pic 1932. — Colombie. — Ht.
rectefasciatus Pic 1932. — Brésil. — Ht., 1 pt.
robustus Pic 1931. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 5 pt.
rubronotatus Pic 1931. — Bolivie : Cochabamba. — Ht.
suturalis Pic 1932 (= *suturata* Uhm. nom. nov.). — Amérique centrale.
venezuelensis Pic 1931. — Vénézuéla : Caracas. — Ht., 1 pt.
viridiceps Pic 1934. — République Argentine : Santiago del Estero. — Ht.

1. Pour cette espèce la référence du *Coleopterorum Catalogus* est fausse. Il faut lire : *Bull. Soc. Zool. Fr.*, LVI, 1931, p. 434.

wagneri Pic 1931 (*medius* var.). — République Argentine : Chaco de Santiago. — Ht.

Genre **Goyachalepus** Pic.

donckieri Pic 1929. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 4 pt.

Genre **Oxychalepus** Uhmann.

biinterruptus Pic 1932 (*proximus* var.). — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 16 pt.
trispinosus Pic 1931. — Guyane Française : Cayenne. — Ht.

Genre **Baliosus** Weise.

baeri Pic 1932. — Pérou : Huallaga. — Ht.
donkieri Pic 1934. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 4 pt.
germaini Pic 1932. — Bolivie : Cochabamba. — Ht.
holtzi Pic 1934. — Paraguay : Mborero. — Ht.
hospes Weise 1905. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 7 pt.
illustris Weise 1905. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 5 pt.
incertus Pic 1934. — Costa-Rica : Turrialba. — Ht., 1 pt.
incisus Pic 1931. — Brésil. — Ht., 3 pt.
insignatus Pic 1932 (*incisus* var.). — Guyane : Maroni. — Ht.
latipennis Pic 1934. — Brésil : Hansa (Sta Catharina). — Ht.
longicornis Pic 1932. — Bolivie : Cochabamba. — Ht., 1 pt.
multifasciata Pic 1933 (= *duodecimmaculatus* Baly). — Brésil. — Ht., 5 pt.
quadrilineatus Pic 1932. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht.
subdilatatus Pic 1932. — Bolivie : Cochabamba. — Ht., 3 pt.

Genre **Physocoryna** Guérin-Méneville.

expansa Pic 1925. — Guyane Française : Cayenne. — Ht.

Genre **Octotoma** Dejean.

germaini Pic 1925. — Bolivie : Cochabamba. — Ht.

Genre **Brachycoryna** Guérin-Méneville.

notaticeps Pic 1928. — République Argentine : Chaco de Santiago. — Ht.

Genre **Probaenia** Weise.

baeri Pic 1927. — Pérou : Huallaga. — Ht.
bicoloricornis Pic 1927. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 1 pt.
bicoloripes Pic 1927. — Brésil : Rio Grande do Sul. — Ht.
boliviana Pic 1927. — Bolivie : Cochabamba. — Ht.
clara Weise 1905. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 6 pt.
clermonti Pic 1933. — Brésil : Hansa (Santa Catharina). — Ht.
donckieri Pic 1927. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht.
germaini Pic 1927. — Bolivie : Cochabamba. — Ht.
latefasciata Pic 1927. — Pérou : Marcapata. — Ht.
luteonotata Pic 1927. — Brésil. — Ht.
maculaticeps Pic 1927. — Équateur : Loja. — Ht.
major Pic 1927. — Brésil. — Ht.
mimica Pic 1933 (= *crenata* Blanch.). — Brésil. — Ht.
nigripes Chapuis 1877 (*crenata* var.). — Paraguay : Asuncion. — Ht. 4 pt.
nigritarsis Weise 1905. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 12 pt.
obliterata Pic 1927 (*nigritarsis* var.). — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 2 pt.
pallidior Pic 1927. — Bolivie : Cochabamba. — Ht.
preapicalis Pic 1933 (= *nigripes* Chap.). — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 2 pt.
purpureotincta Pic 1927. — Bolivie : Cochabamba. — Ht., 3 pt.
quadrivittata Pic 1927. — Brésil : Therezopolis. — Ht.
reducta Pic 1927 (*purpureotincta* var.). — Bolivie : Cochabamba. — Ht.
ruficeps Pic 1927. — Pérou : Surimaguas. — Ht.
ruficornis Pic 1938. — Brésil : Rio. — Ht.
rufitarsis Pic 1933 (*grayi* var.). — Brésil. — Ht.
sinuata Pic 1927. — Bolivie : Santa Fé de Bogota. — Ht., 2 pt.
tessellata Weise 1905. — Brésil : Caraça (Minas Geraes). — Ht., 5 pt.
tricolor Pic 1927. — Amérique méridionale. — Ht.
uhmanni Pic 1927 (= *tibiella* Weise). — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 1 pt.
variolaris Weise 1905. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 4 pt.
viridiceps Pic 1927. — Bolivie : Cochabamba. — Ht.
viridinotata Pic 1927. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht.
vittulosa Weise 1905. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 13 pt.

Genre **Uroplata** Chevrolat.

Sous-genre **Codiohispa** Maulik.

atricornis Pic 1927. — République Argentine : Sierra de Cordoba. — Ht.

daguerrei Pic 1930. — République Argentine : Rosas. — Ht.
donceeli Pic 1937. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 3 pt.
ferruginea Weise 1905. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 6 pt.
girardi Pic 1934. — République Argentine : Tucuman. — Ht., 2 pt.
irregularis Pic 1933. — République Argentine : Corrientes. — Ht.
maculata Weise 1905 (= *bipuncticollis* Chapuis). — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 10 pt.
maculicollis Weise 1905. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 7 pt.
orphanula Weise 1905. — Brésil : Ceara de Baturite. — Ht., 3 pt.
subdilatata Pic 1927 (= *minuscula* Chapuis). — Uruguay : Montevideo. — Ht., 1 pt.

Sous-genre **Uroplata** s. str.

approximata Pic 1931. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht.
atriceps Pic 1933. — Brésil. — Ht., 1 pt.
basifemoralis Pic 1933. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht.
bicoloriceps Pic 1933. — Bolivie : Cochabamba. — Ht.
bilineatithorax Pic 1933 (*obscurella* var.). — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht.
brevenotata Pic 1933. — Brésil : Bahia. — Ht.
chilensis Pic 1933. — Chili. — Ht.
costaricana Pic 1932. — Costa-Rica : Turrialba. — Ht., 2 pt.
curvatipes Pic 1932 (*fusca* var.). — Costa-Rica : Turrialba. — Ht.
diversicollis Pic 1933 (*basifemoralis* var.). — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht.
donckieri Pic 1933. — Bolivie : Cochabamba. — Ht.
fasciata Pic 1933. — Guyane Française : Cayenne. — Ht.
germaini Pic 1927. — Bolivie : Cochabamba. — Ht.
humeralis Pic 1933. — Pérou : Vilcanota. — Ht.
incisipennis Pic 1933 (= *obscurella* Weise). — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 3 pt.
latefasciata Pic 1933 (= *obscurella* var.). — Bolivie : Cochabamba [1]. — Ht. 1 pt.
notaticollis Pic 1933 (*ruficornis* var.). — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht.
obliteratithorax Pic 1933 (*obscurella* var.). — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 1 pt.
peruana Pic 1927. — Pérou : Cuallanga. — Ht.
ruficornis Pic 1933. — Brésil : Therezopolis. — Ht., 2 pt.
rufifrons Pic 1933. — Pérou : Marcapata. — Ht., 1 pt.
singularis Pic 1931. — Brésil : Therezopolis. — Ht.
spinosa Pic 1932. — Vénézuéla : Caracas. — Ht.

1. et non Brésil comme il est indiqué par erreur au *Coleopterorum Catalogus*.

subluteofasciata Pic 1927. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht.
varicostata Pic 1932. — Costa-Rica : Turrialba. — Ht., 1 pt.

Sous-genre : **Plicatopalpa** Pic.

irregularis Pic 1932. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht.

Genre **Octuroplata** Uhmann.

innotaticollis Pic 1933 (*uhmanni* var.). — Brésil : Miniero. — Ht.
uhmanni Pic 1933. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 5 pt.

Genre **Oxyroplata** Uhmann.

clienta Weise 1905. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 8 pt.
diversicolor Pic 1932. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht.

Genre **Heterispa** Chapuis.

apicalis Pic 1927. — Colombie. — Ht.
breveapicalis Pic 1931. — (= *vinula westwoodi*). — Costa-Rica : Turrialba. — Ht., 7 pt.
orientalis Weise 1906 (*costipennis* var.). — Brésil : Sao-Paulo. — Ht.

Genre **Acanthodes** Baly.

baeri Pic 1927. — Pérou : Huallaga. — Ht.
diversicornis Pic 1927. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht.
donckieri Weise 1904. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 17 pt.
leseleuci Guérin 1844. — Guyane Française : Cayenne. — Ht., 1 pt.
multinotata Pic 1927. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht.
notaticeps Pic 1927. — Bolivie : Cochabamba. — Ht.

Genre **Octhispa** Chapuis. [1]

angustatipennis Pic 1932. — Bolivie : Songo. — Ht.
atriceps Pic 1929. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht.
brasiliensis Pic 1927 (= *severini*). — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 1 pt.
brevedentata Pic 1933. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 2 pt.
callangana Pic 1927. — Pérou : Callanga. — Ht.
discobilineata Pic 1927. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht.
diversa Pic 1927 (*brasiliensis* var.). — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht.

1. *Maculaticeps* Pic 1929. Type détruit.

diversicornis Pic 1927. — Bolivie : Cochabamba. — Ht.
goyasensis Pic 1927. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht.
gracilis Weise 1905. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 7 pt.
inlineata Pic 1929. — Brésil : Mineiro. — Ht.
innotata Pic 1928 (= *concava* Baly). — Guyane : Maroni. — Ht., 2 pt.
lateralis Pic 1929. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 1 pt.
madoni Pic 1934. — Guyane : Cayenne. — Ht.
parallela Pic 1929. — Bolivie : Cochabamba. — Ht., 1 pt.
perroudi Pic 1934. — Brésil. — Ht.
postexpansa Pic 1927. — Bolivie : Cochabamba. — Ht., 2 pt.
prescutellaris Pic 1929. — Pérou : Marcapata. — Ht.
proba Weise 1905. — Cochabamba. — Ht., 5 pt.
quadrinotata Weise 1905. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 9 pt.
robusta Pic 1921. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht.
rubronotata Pic 1927 (*clavareaui* var.). — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 3 pt.
subfasciata Pic 1927. — Brésil. — Ht.
subparallela Pic 1929. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 2 pt.
testaceipes Pic 1929. — Panama. — Ht., 3 pt.
viridinotata Pic 1929. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 3 pt.
viridivittata Pic 1929. — Amérique méridionale. — Ht.

Genre **Platocthispa** Uhmann.

insignita Pic 1933 (*fulvescens* var.). — Guatemala : El Naranjo. — Ht.

Genre **Hepthispa** Weise.

bilineatithorax Pic 1929. — Guyane : Cayenne. — Ht.
donckieri Pic 1929. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 1 pt.
lineaticollis Pic 1928. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 3 pt.
ruficornis Pic 1929. — Brésil : Jatahy (Goyaz). — Ht., 3 pt.

Genre **Mimoethispa** Pic.

irregularis Pic 1929. — Brésil : Rio Grande do Sul. — Ht.

Genre **Euprionota** Guérin-Méneville.

subparallela Pic 1932. — Mexique : Sierra de Durango. — Ht.

Genre **Pentispa** Chapuis.

cyannipennis Pic 1933. — Jamaïque. — Ht.
geniculata Pic 1932. — Pérou : Marcapata. — Ht.
perroudi Pic 1933. — Mexique. — Ht.
pratti Pic 1932. — Colombie. — Ht.
viturati Pic 1932. — Équateur : Ambato. — Ht.

Genre **Microrhopala** Chevrolat.

submaculata Pic 1932 (*perforata* var.). — Costa-Rica : Turrialba. — Ht.